9.4 Tabac - Alcool - Toxicomanie

En 2010, un quart des femmes et un tiers des hommes de 15 à 75 ans déclarent fumer habituellement. Environ 5 % déclarent fumer occasionnellement. Après une diminution globale du tabagisme quotidien entre 2000 et 2005, la part de fumeurs quotidiens chez les 15-75 ans a augmenté de 2 points entre 2005 et 2010 passant de 27,1 % à 29,1 %. Les chômeurs comptent toujours en 2010 davantage de fumeurs quotidiens (51 %) que les actifs occupés (33 %) du même âge. Un non fumeur sur cinq déclare être régulièrement ou de temps en temps exposé à la fumée de tabac à domicile. Les ventes de tabac en France métropolitaine augmentent légèrement en 2010 pour atteindre près de 64 800 tonnes. Cette évolution est surtout liée à l'augmentation des ventes de tabac à rouler. Malgré une hausse plus importante de son prix, il reste toujours meilleur marché, encourageant probablement une partie des fumeurs à reporter sa consommation sur ce type de produit. Les traitements pour l'arrêt du tabac augmentent sensiblement, particulièrement les timbres transdermiques.

La consommation moyenne d'alcool pur par habitant de 15 ans ou plus est estimée à 12,4 litres en 2009. Le rythme de diminution de la consommation d'alcool sur le territoire français, assez rapide au début des années 2000, s'est ralenti depuis 2005 mais reste orienté à la baisse. Cette diminution s'inscrit dans le prolongement d'une tendance plus ancienne et provient essentiellement de la baisse de la consommation de vin. Cependant, la France fait toujours partie des pays de

l'Union européenne les plus consommateurs d'alcool, mais elle ne se situe plus en tête du classement.

En 2010, près de quatre adultes sur dix entre 18 et 75 ans présentent une consommation d'alcool à risque, dont un quart un risque d'alcoolisation excessive chronique. Les risques apparaissent deux à trois fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes et varient avec l'âge. On observe chez les plus jeunes un accroissement des usages à risque chez les hommes comme chez les femmes, en particulier chez les femmes jeunes, entre 18 et 24 ans. Les épisodes d'ivresse au cours de l'année augmentent globalement et ce dans toutes les classes d'âge et quel que soit le sexe.

Parmi les drogues illicites, le cannabis reste de très loin la substance la plus consommée. Son usage régulier concerne plus d'un million de personnes en France. En 2010, environ un tiers des adultes âgés de 18 à 64 ans déclare en avoir déjà consommé au cours de leur vie. Cette expérimentation est davantage le fait des hommes que des femmes. La proportion de personnes ayant expérimenté le cannabis est maximale entre 26 et 34 ans pour les hommes, 18 et 34 ans pour les femmes et diminue après 55 ans pour les deux sexes. La consommation de cocaïne, deuxième produit illicite le plus consommé, se situe bien en decà et touche environ dix fois moins de personnes, que ce soit en termes d'expérimentation ou d'usage dans l'année.

Définitions

Cannabis: plante herbacée classée comme stupéfiant. Elle est utilisée pour la production de marijuana (herbe), de résine (haschisch) et d'huile de cannabis. La teneur en principe psychoactif de ces différentes formes varie selon les zones et les modes de production, les parties de la plante utilisées et les procédés de fabrication. Elle est le plus souvent fumée sous forme de cigarette.

Consommation d'alcool : consommation mesurée en grammes d'alcool pur par jour et par adulte.

Consommation totale de tabac : consommation mesurée en grammes de tabac par adulte et par jour.

Prix relatif du tabac : prix nominal du tabac divisé par l'indice général des prix.

Alcool, cocaïne, héroïne, poppers, tabac, traitements pour l'arrêt du tabac : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « L'état de santé de la population en France Rapport 2011 », ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, novembre 2011.
- « Les niveaux d'usage des drogues en France en 2010 », Tendances n° 76, OFDT, juin 2011.
- « Enquête SINTES 2009 sur la composition des produits de synthèse », rapport d'études, OFDT, avril 2011.
- « Drogues illicites : les observations du dispositif TREND en 2009 », Tendances nº 73, OFDT, décembre 2010.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références

Ventes d'alcool par habitant


en litres d'alcool pur

	2000	2005	2008	2009	2010
Vins	8,5	7,4	7,0	7,1	6,9
Bières	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
Spiritueux	2,7	2,6	2,8	2,7	2,7
Autres	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Total	14.0	12.7	12,3	12,3	12,0

Champ : population résidente de 15 ans ou plus.

Note : ces données prennent en compte la consommation d'alcool sur le territoire français, l'autoconsommation des producteurs de vins et les achats d'alcool des non résidents. Les achats d'alcool par les Français à l'étranger ne sont pas comptabilisés. Source : OFFIT

Usage quotidien d'alcool au cours de l'année 2010 selon le sexe et l'âge




Expérimentation des substances psychoactives en 2010


en % Hommes Femmes Ensemble Alcool 96.5 93,3 94.9 Tabac 82,7 74,2 78.3 Cannabis 40.5 25,4 32,8 7,2 3,4 5,3 **Poppers** Cocaïne 5,5 2,2 3,8 Champignons hallucinogènes 4.9 1.6 3.2 2,7 Ecstasy/MDMA 4,0 1,4 Colles et solvants 2,7 1,1 1,9 LSD 2,7 0,9 1,8 Amphétamines 2,2 1,3 1,7 Héroïne 1,9 0,6 1,2

Champ: personnes de 18 à 64 ans en France métropolitaine. Sources: Insee; Inpes, Baromètre santé 2010.

Ventes totales de tabac



Proportion de fumeurs quotidiens de tabac, suivant l'âge et le sexe



Ventes de traitements pour l'arrêt du tabac

en équivalent nombre de patients traités

	2008	2009	2010
Timbres transdermiques	631 828	682 459	773 378
Substituts sous forme orale	848 523	926 004	982 951
Traitements pharmacologiques	416 300	295 094	302 616


Source: GERS.

Substances principalement en cause dans les décès par surdoses

		2006		2007		2008
		en %		en %		en %
Héroïne	59	35,1	69	35,9	79	36,4
Cocaïne	31	18,5	39	20,3	30	13,8
Autres substances illicites	5	3,0	2	1,0	4	1,8
Méthadone	31	18,5	61	31,8	63	29,0
Buprénorphine	20	11,9	11	5,7	21	9,7
Autres médicaments opiacés	18	10,7	10	5,2	19	8,8
Autres	4	2,4	0	0,0	1	0,5
Total	168	100,0	192	100,0	217	100,0

Note : chaque substance est seule ou associée à d'autres produits. Seuls les décès provoqués par un usage de drogues sont mentionnés. Source : Afssaps, données DRAMES.

Évolution de la consommation de produits illicites



Champ: patients pris en charge et présentant un abus, une pharmacodépendance ou un sous-traitement de substitution aux opiacés.

Source: Afssaos.

Santé 99