

## 9.4 Tabac - Alcool - Toxicomanie

La **consommation** excessive d'**alcool** est à l'origine d'une part importante de la morbidité (cancers, maladies chroniques du foie, atteintes psychiques, séquelles d'accidents) et de la mortalité prématurée. La France fait toujours partie des pays de l'Union européenne les plus consommateurs d'alcool. Si les quantités d'alcool consommées sur le territoire français ont baissé d'un peu plus de 10 % entre 1999 et 2007, ce fléchissement prolonge une tendance plus ancienne et provient essentiellement de la diminution de la consommation de vin. La consommation moyenne annuelle d'alcool pur par habitant de 15 ans ou plus s'est cependant stabilisée entre 2005 et 2007 à 12,8 litres. Environ un tiers des personnes de 18 ans ou plus ont une consommation d'alcool considérée à risque. Les femmes ont globalement une consommation trois fois plus faible que celle des hommes.

Plus encore que l'alcool, et souvent en association avec lui ou avec certaines expositions professionnelles, le tabagisme est responsable d'un nombre très élevé de cancers, notamment pulmonaires et des voies aérodigestives supérieures. Le développement du tabagisme féminin au cours des quarante dernières années se traduit actuellement par un accroissement du taux de décès par cancer du poumon en particulier chez les femmes de moins de 65 ans (+ 105 % entre 1990 et 2005), alors qu'il a diminué dans le même temps chez les hommes (- 14 %). Mais les décès par cancer du poumon restent majoritairement masculins (80 %). Le **tabac** est également à

l'origine de maladies respiratoires chroniques et de maladies cardiovasculaires.

En 2006, 23 % des femmes et 33 % des hommes de 15 à 74 ans déclarent fumer habituellement. Le pourcentage de fumeurs quotidiens décroît globalement depuis quelques années, mais présente une relative stabilité chez les femmes depuis les années 1980. À l'adolescence, les habitudes de consommation des filles et des garçons sont désormais peu différenciées. L'usage quotidien du tabac a diminué, passant de 40 % à 32 % chez les filles de 17 ans entre 2000 et 2005, et de 42 % à 34 % chez les garçons. Les hausses des prix ont sans doute contribué à cette réduction de la consommation.

Les interpellations pour usage de stupéfiants augmentent très fortement en 2008 (+ 31 %). Leur nombre est proche de 150 000 interpellations, soit un quasi triplement depuis le milieu des années 1990. Ces interpellations concernent dans 90 % des cas des usagers de **cannabis**. Après avoir constamment diminué entre 1994 et 2003, les interpellations pour usage d'**héroïne** repartent à la hausse depuis 2004. Entre 2003 et 2008, le nombre d'usagers d'héroïne interpellés a plus que doublé. La répartition par produits des interpellations pour usage de stupéfiants autres que le cannabis est bien différente en 2008 de celle qu'elle était au milieu des années 1990 : les interpellations pour usage de cocaïne (avec le crack) représentent près de 70 % de celles pour usage d'héroïne contre 5 % en 1994. ■

### Définitions

**Cannabis** : plante herbacée classée comme stupéfiant. Elle est utilisée pour la production de marijuana (herbe), de résine (haschisch) et d'huile de cannabis. La teneur en principe psychoactif de ces différentes formes varie selon les zones et les modes de production, les parties de la plante utilisées et les procédés de fabrication. Elle est le plus souvent fumée sous forme de cigarette.

**Consommation d'alcool** : consommation mesurée en grammes d'alcool pur par jour et par adulte.

**Consommation totale de tabac** : consommation mesurée en grammes de tabac par adulte et par jour.

**Prix relatif du tabac** : prix nominal du tabac divisé par l'indice général des prix.

**Alcool, héroïne, tabac** : voir rubrique « définitions » en annexes.

### Pour en savoir plus

- « L'état de santé de la population en France en 2008 », *Études et résultats* n° 711, Drees, décembre 2009.
- « Alcool, tabac et cannabis à 16 ans », *Tendances* n° 64, janvier 2009, OFDT.
- « Usages de drogues des étudiants, chômeurs et actifs de 18-25 ans », *Tendances* n° 62, novembre 2008, OFDT.
- Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), [www.drogues.gouv.fr](http://www.drogues.gouv.fr).
- Inpes, [www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr).


## Consommation de boissons alcoolisées

en litres par personne

	1990	1995	2000	2005	2007 (p)
Bière	40,1	38,6	33,8	32,4	30,8
Vins courants	44,7	36,6	29,1	23,7	23,1
Vins AOC	22,9	24,2	26,1	24,2	23,3
Cidre	6,3	5,3	4,1	3,4	2,7
Champagne	1,9	2,0	1,9	2,1	2,2
Vins doux naturels	1,5	1,3	0,9	0,7	0,6

Sources : Insee ; OFDT.

## Évolution de la consommation d'alcool



Lecture : 10 grammes d'alcool pur correspondent à un verre de boisson alcoolisée servi dans un café soit à peu près 10 cl de vin à 12,5 degrés, 25 cl de bière à 5 degrés, 6 cl de porto à 20 degrés et 3 cl de whisky ou autre spiritueux à 40 degrés  
Champ : population de 15 ans ou plus.

Source : Insee.

## Consommation de tabac et d'alcool dans le monde


	Part de la population fumant quotidiennement en %			Consommation d'alcool par habitant en litres		
	2000	2005	2006	2000	2005	2006
Allemagne	...	23,2	...	10,5	10,0	10,1
États-Unis	19,1	16,9	16,7	(r) 8,2	8,4	...
Finlande	23,4	21,8	21,4	8,6	10,0	10,1
<b>France</b>	<b>27,0</b>	<b>...</b>	<b>25,0</b>	<b>14,0</b>	<b>12,7</b>	<b>...</b>
Islande	22,9	19,5	19,3	6,1	7,1	7,2
Japon	32,9	29,2	26,3	(r) 8,6	8,5	7,9
Norvège	32,0	25,0	24,0	5,7	6,4	6,5
Nouvelle-Zélande <sup>1</sup>	25,0	22,5	20,7	8,9	9,4	9,4
Royaume-Uni	27,0	24,0	22,0	10,4	11,3	10,9
Suède	18,9	15,9	...	6,2	6,6	6,8

1. Rupture de série en 2006 pour la consommation de tabac.

Champ : population de 15 ans ou plus.


Source : OCDE.

## Proportion de fumeurs réguliers ou occasionnels de tabac selon l'âge et le sexe en 2007



Source : INPES, Baromètre santé environnement 2007.

## Consommation et prix relatif du tabac



1. Consommation par adulte de 15 ans ou plus.

Sources : Insee ; Institut Gustave Roussy.

## Usage régulier de tabac, d'alcool et de cannabis à 16 ans

	1999		2007	
	Garçons	Filles	Garçons	Filles
Tabac quotidien <sup>1</sup>	33	30	18	16
Alcool régulier <sup>2</sup>	12	5	18	9
Ivresse régulière <sup>3</sup>	5	2	4	3
Cannabis régulier <sup>4</sup>	8	3	5	2

1. Au moins 1 cigarette par jour au cours des 30 derniers jours.


2. Au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours.

3. Au moins 10 ivresses au cours des 12 derniers mois.

4. Au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours.

Sources : Espad ; OFDT-Inserm.

## Évolution de la consommation de produits illicites



Champ : agents pris en charge et présentant un abus, une pharmacodépendance ou un sous traitement de substitution aux opiacés.

Source : AIsaps.

## Interpellations pour usage de stupéfiants

	1995	2000	2005	2008
Cannabis	36 325	73 661	90 905	133 160
Héroïne	13 299	4 831	4 486	7 827
Cocaïne, crack	997	2 651	3 498	5 214
Ecstasy	844	1 432	1 272	619
Autres <sup>1</sup>	647	810	886	1 107
<b>Total</b>	<b>52 112</b>	<b>83 385</b>	<b>101 047</b>	<b>147 927</b>

1. Amphétamines, LSD, champignons, médicaments...

Source : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants.