

9.1 Maladies - Accidents

Comparativement aux pays de même niveau de vie, l'état de santé des français apparaît globalement bon. L'espérance de vie continue d'augmenter, contribuant au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes atteintes de pathologies chroniques et d'incapacité fonctionnelle. Des disparités notables perdurent toutefois tant entre hommes et femmes qu'entre territoires ou catégories sociales.

Si les femmes bénéficient d'une espérance de vie supérieure à celle des hommes (85,4 ans en 2014 contre 79,2 ans pour les hommes), l'écart entre les sexes ne cesse de se réduire. Il est passé de 8,2 ans en 1994 à 6,2 ans en 2014. L'espérance de vie à 65 ans est de 23,4 ans pour les femmes, soit 2,2 ans de plus qu'en 2000 et de 19,1 ans pour les hommes, soit 2,4 ans de plus. L'**espérance de vie à la naissance** et à 65 ans des hommes et des femmes en France fait partie des plus élevées en Europe. En revanche, l'espérance de vie des hommes avant 65 ans se situe dans la moyenne européenne. Ce décalage observé chez les hommes s'explique en partie par le poids des décès prématurés.

La hiérarchie des **causes de décès** est inversée chez les hommes et chez les femmes. Ainsi, les maladies de l'appareil circulatoire restent la première cause de mortalité chez les femmes, devant les tumeurs. C'est l'inverse chez les hommes. À âge égal, on observe toutefois une surmortalité masculine : le taux de mortalité par maladies de l'appareil circu-

latoire standardisé sur l'âge est 1,6 fois plus élevé chez les hommes. Pour la mortalité par tumeurs, cette surmortalité est encore plus marquée : le **taux standardisé de mortalité** par tumeur maligne est 2 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Pour toutes les localisations cancéreuses à l'exception de celles spécifiquement féminines, les taux standardisés de décès sont plus élevés chez les hommes. On retrouve ici le poids de la **mortalité prématurée**, dont celle attribuable au tabac et à l'alcool, mais également celui des expositions professionnelles et des comportements nutritionnels plus favorables aux femmes. Le taux de décès prématuré des hommes standardisé sur la structure d'âge est en effet 2,2 fois supérieur à celui des femmes. Ce rapport est de 3,5 pour les décès liés aux troubles mentaux et du comportement et de 3,1 pour les morts violentes (suicides, accidents...) et les maladies de l'appareil circulatoire. L'évolution des comportements des femmes vis-à-vis du tabac et de l'alcool est dès à présent lisible dans l'évolution des taux standardisés de mortalité pour les tumeurs des voies aériennes supérieures, du poumon et du foie.

En 2014, les **accidents de travail** avec arrêt s'élevaient à 621 000, en hausse de 0,4 % par rapport à 2013. Sur environ 759 500 sinistres ayant donné lieu à un arrêt en 2014, 82 % concernent des accidents de travail, 11 % des accidents de trajet et 7 % des maladies professionnelles. ■

Définitions

Mortalité prématurée : ensemble des décès survenus avant l'âge de 65 ans.

Taux de mortalité standardisé : taux de mortalité d'une population présentant une distribution standard par âge. Il permet la comparaison entre périodes et entre pays, ces taux visant à chiffrer les décès indépendamment des différences entre les pyramides des âges des populations.

Accident corporel de la circulation, accident du travail, affection de longue durée (ALD), cause de décès, dépense de prévention, espérance de vie à la naissance, Inserm, prévalence, vaccins : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « Les chiffres clés de la Sécurité sociale 2014 », Direction de la Sécurité sociale, septembre 2015.
- « Le recours aux soins des sans-domiciles : neuf sur dix ont consulté un médecin en 2012 », *études et résultats* n° 933, Drees, septembre 2015.
- « La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge », *études et résultats* n° 920, Drees, juin 2015.
- « Risques psychosociaux et situation économique des entreprises », *Dares Analyses* n° 44, juin 2015.
- « La santé et les soins », *Économie et statistique* n° 475-476, Insee, avril 2015.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »

Causes médicales de décès par sexe

en milliers

| | 1990 | | | 2000 | | | 2012 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total |
| Tumeurs | 85,9 | 55,4 | 141,3 | 89,6 | 59,8 | 149,4 | 92,4 | 67,9 | 160,3 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 78,8 | 94,9 | 173,7 | 74,8 | 86,6 | 161,3 | 65,2 | 75,8 | 141,0 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | 19,8 | 18,2 | 38,0 | 18,3 | 17,3 | 35,6 | 19,2 | 18,8 | 38,0 |
| Maladies du système nerveux et des organes des sens | 5,4 | 5,9 | 11,3 | 8,7 | 11,3 | 20,0 | 13,7 | 22,1 | 35,8 |
| Maladies de l'appareil digestif | 14,4 | 12,6 | 27,0 | 12,5 | 11,1 | 23,7 | 12,2 | 10,4 | 22,6 |
| Troubles mentaux et du comportement | 5,5 | 7,4 | 12,9 | 7,0 | 10,3 | 17,3 | 8,9 | 12,7 | 21,6 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 5,0 | 8,3 | 13,3 | 7,9 | 11,1 | 19,0 | 8,7 | 10,8 | 19,5 |
| Maladies infectieuses et parasitaires | 5,7 | 3,9 | 9,6 | 5,4 | 5,1 | 10,5 | 5,5 | 6,0 | 11,5 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 7,3 | 4,2 | 4,5 | 8,7 |
| Autres maladies | 18,3 | 23,4 | 41,7 | 18,5 | 25,3 | 43,8 | 28,8 | 33,8 | 62,6 |
| Causes externes | 28,6 | 19,0 | 47,6 | 24,4 | 16,5 | 40,9 | 22,0 | 14,8 | 36,8 |
| <i>dont suicides</i> | 8,1 | 3,2 | 11,4 | 7,9 | 2,9 | 10,8 | 7,3 | 2,4 | 9,7 |
| Total | 271,0 | 252,6 | 523,6 | 270,7 | 258,1 | 528,8 | 280,7 | 277,6 | 558,3 |

Champ : France métropolitaine, décès domiciliés.

Source : Inserm, CépiDC.

Prévalence des maladies dans les affections de longue durée en 2013

| Au 31 décembre | Taux de prévalence pour 100 000 personnes | Part des hommes en % | Part des femmes en % |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Diabète de types 1 et 2 | 3 723 | 52,7 | 47,3 |
| Tumeur maligne | 3 296 | 45,0 | 55,0 |
| Affections psychiatriques de longue durée | 1 970 | 44,8 | 55,2 |
| Maladie coronaire | 1 723 | 70,3 | 29,7 |
| Hypertension artérielle sévère | 1 655 | 43,5 | 56,5 |
| Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves | 1 437 | 50,6 | 49,4 |
| Artér. chr. avec manif. ischémiques | 808 | 67,3 | 32,7 |
| Insuf. respiratoire chronique grave | 614 | 50,7 | 49,3 |
| Accident vasculaire cérébral invalidant | 594 | 51,7 | 48,3 |
| Maladie d'Alzheimer et autres démences | 497 | 27,0 | 73,0 |

Source : CNAMTS.

Insécurité routière

| | 2005 | 2010 | 2014 | 14/13 en % |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|------------|
| Accidents corporels | 84 525 | 67 288 | 58 191 | 2,4 |
| Tués ¹ | 5 318 | 3 992 | 3 384 | 3,5 |
| Blessés | 108 076 | 84 461 | 73 048 | 3,5 |
| <i>dont hospitalisés²</i> | 39 811 | 30 393 | 26 635 | 2,6 |

1. Décès survenus dans les 30 jours suivant l'accident.

2. Victimes blessées dont l'état nécessite plus de 24 heures d'hospitalisation.

Champ : France métropolitaine.

Source : ONISR.

Répartition sectorielle des accidents de travail

en milliers de salariés

| | 2007 | | 2014 | |
|--------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | Accidents du travail en 1 ^{er} règlement | en % | Accidents du travail en 1 ^{er} règlement | en % |
| Métallurgie | 78,2 | 10,9 | 52,1 | 8,4 |
| BTP | 131,3 | 18,2 | 96,8 | 15,6 |
| Transports, EGE, etc. | 96,0 | 13,3 | 89,9 | 14,5 |
| Alimentation | 121,0 | 16,8 | 109,4 | 17,6 |
| Chimie, caoutchouc, plasturgie | 15,4 | 2,1 | 10,8 | 1,7 |
| Bois, ameublement, etc. | 32,1 | 4,5 | 20,0 | 3,2 |
| Commerce non alimentaire | 58,5 | 8,1 | 49,7 | 8,0 |
| Activités de services | 187,7 | 26,1 | 192,4 | 31,0 |
| Ensemble | 720,2 | 100,0 | 621,1 | 100,0 |

Champ : comités techniques nationaux, non compris bureaux, sièges sociaux et autres catégories professionnelles particulières.

Source : CNAMTS.

Dépenses de prévention

en millions d'euros

| | 2007 | 2013 (r) | 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Prévention individuelle primaire | 2 599 | 2 929 | 2 947 |
| Vaccins | 106 | 108 | 109 |
| PMI - Planning familial ¹ | 653 | 681 | 670 |
| Médecine du travail | 1 407 | 1 599 | 1 619 |
| Médecine scolaire | 434 | 540 | 549 |
| Prévention individuelle secondaire | 630 | 687 | 666 |
| <i>dont : dépistage des tumeurs</i> | 159 | 194 | 179 |
| <i>dépistage et lutte contre les maladies infectieuses</i> | 222 | 216 | 209 |
| <i>examens de santé</i> | 175 | 184 | 183 |
| Prévention collective | 2 258 | 2 277 | 2 251 |
| Prévention à visée comportementale | 485 | 476 | 459 |
| <i>dont information, promotion, éducation à la santé</i> | 368 | 343 | 334 |
| Prévention à visée environnementale | 1 773 | 1 801 | 1 792 |
| <i>dont : hygiène du milieu²</i> | 497 | 536 | 553 |
| <i>prévention des risques professionnels</i> | 224 | 260 | 247 |
| <i>prévention et lutte contre la pollution</i> | 145 | 143 | 138 |
| <i>observation, veille, recherche, règlements urgences et crises</i> | 93 | 48 | 39 |
| <i>sécurité sanitaire de l'alimentation</i> | 554 | 505 | 512 |
| Total des dépenses de prévention | 5 487 | 5 892 | 5 864 |


1. PMI : protection maternelle et infantile.

2. Y c. lutte anti-vectorielle.

Source : Drees.

Victimes d'accidents de la route dans quelques pays de l'Union européenne en 2014

en nombre de décès par million d'habitants



Note : décès survenus dans les 30 jours suivant l'accident.

Source : Eurostat.