# Objectif 3 : Santé et bien-être

Cible ONU 3.5 – Renforcer la prévention et le traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d'alcool.

## Indicateur 3.i5: Consommation d'alcool

## Concepts et définitions

#### Définition

Proportion de personnes parmi la population de 18 à 75 ans, répartie selon différents modes de consommation d'alcool

#### Champ

France métropolitaine, population des 18-75 ans.

#### **Commentaires**

Cet indicateur permet de suivre la proportion de personnes visés par la cible concernant l'abus d'alcool et donc l'efficacité de sa mise en œuvre.

Cet indicateur ne peut être rattaché à un indicateur onusien car trop dissimilaire, mais il peut être rattaché à la cible ONU 3.5.

### Méthodologie

#### Méthode de calcul

Le calcul de l'indicateur repose sur les réponses obtenues aux questions suivantes, incluant les trois premières questions de l'*Alcohol Use Disorder Identification Test* (AUDIT) :

- « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu du vin, de la bière, des alcools forts, d'autres alcools comme du cidre, champagne, porto...? » Tous les jours / 4 à 6 fois par semaine / 2 ou 3 fois par semaine / 1 fois par semaine / 2 ou 3 fois par mois / 1 fois par mois ou moins souvent / Jamais.
- « Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans la journée, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ? »
- « À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres de boissons alcoolisées ou plus en une même occasion? Jamais / Moins d'une fois par mois / Une fois par mois / Une fois par semaine / Tous les jours ou presque.
- « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été ivre ? »

La classification des buveurs qui en résulte comporte cinq niveaux pour cet indicateur :

• les individus ayant consommé de l'alcool au moins une fois dans l'année ;

Insee.fr: Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable – Janvier 2025

- les individus ayant consommé de l'alcool tous les jours ;
- les individus ayant au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) (épisode de consommation d'au moins six verres en une occasion) au cours des 12 derniers mois ;
- les individus ayant au moins une ivresse au cours des 12 derniers mois ;
- les individus ayant au moins dix ivresses au cours des 12 derniers mois.

#### Désagrégations retenues

Aucune.

#### Désagrégations territoriales

Il est possible de calculer des données régionales.

### Source des données

#### **Description**

Les données sont issues du Baromètre Santé, volet Alcool.

### Champ de l'opération

- Champ géographique : France métropolitaine.
- Population statistique : population générale âgée de 15 à 85 ans en 2010, de 15 à 75 ans depuis
  2014 et de 18 à 75 ans en 2017. Les séries sont refaites sur les mêmes tranches d'âge a posteriori.

### Périodicité

Variable.

### Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l'espace)

Le questionnaire est partiellement modifié chaque année en fonction des centres d'intérêt définis à chaque renouvellement de l'enquête, mais un noyau dur de questions reste permanent à des fins comparatives.

## Références / Publications

- « Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021 », Santé publique France, janvier 2023.
- « Consommation d'alcool, comportements et conséquences pour la santé », Santé publique France, février 2019.