

Objectif 3 : Santé et bien-être

Cible ONU: 3.5 - Renforcer la prévention et le traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d'alcool

Indicateur 3.i5 : Consommation d'alcool à risque

Concepts et définitions

Définition de l'indicateur :

Proportion de personnes parmi la population de 18 à 75 ans relevant de chacune des classes de risques de consommation d'alcool définies par le test Audit-C.

Concepts :

Le **test Audit-C** est la version courte du test Audit (Alcohol use disorder identification test), mis au point sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) permet de repérer les consommateurs d'alcool mettant leur santé en danger.

Il tient compte à la fois de la fréquence de consommation au cours des douze derniers mois, du volume absorbé un jour de consommation type et de la fréquence des épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante (voir **Méthode de calcul**).

Champ :

France métropolitaine, population des 18-75 ans.

Commentaires :

Cet indicateur permet de suivre la proportion de personnes visés par la cible concernant l'abus d'alcool et donc l'efficacité de sa mise en œuvre.

Cet indicateur est un indicateur complémentaire¹ aux indicateurs Onusiens et peut être rattaché à la cible ONU 3.5.

¹ *Un indicateur complémentaire est un indicateur ne pouvant pas être rattaché à un indicateur onusien car trop dissimilaire ; mais pouvant être rattaché à une cible ONU la plupart du temps.*

Méthodologie

Méthode de calcul :

Proportion de la population correspondant aux différentes catégories définies par le test audit C en fonction des réponses aux questions du baromètre santé concernant

- La fréquence de consommation

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu...

- 1 Tous les jours
- 2 Quatre fois par semaine ou plus
- 3 Deux ou trois fois par semaine
- 4 Une fois par semaine
- 5 Deux à quatre fois par mois
- 6 Une fois par mois ou moins souvent
- 7 Jamais

- La quantité de consommation :

Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans la journée, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ?

- La fréquence de consommation excessive

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence, vous arrive-t-il de boire six verres de boissons alcoolisées ou plus en une même occasion ?

- 1 Jamais
- 2 Moins d'une fois par mois
- 3 Une fois par mois
- 4 Une fois par semaine
- 5 Tous les jours ou presque

La classification des buveurs qui en résulte comporte 4 niveaux : les individus « sans risque occasionnel », « sans risque régulier », « à risque ponctuel » et « à risque chronique ou dépendant ». Les buveurs « à risque ponctuel » boivent moins que les recommandations courantes mais boivent parfois six verres ou plus, tandis que les buveurs « à risque chronique » boivent plus que les recommandations courantes ou, au moins une fois par semaine, six verres ou plus.

Désagrégations retenues :

Aucune

Agrégats régionaux :

Il est possible de calculer des données régionales.

Source des données

Description :

Les données sont issues du Test Audit-C qui est un module des enquêtes du Baromètre Santé volet Alcool :

<https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/barometre-sante-alcool/>

Champ de l'opération :

Champ géographique : France métropolitaine

Population statistique : Population générale âgée de 15 à 85 ans en 2010 et de 15 à 75 ans depuis 2014

Périodicité :

Variable

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l'espace) :

Le questionnaire est partiellement modifié chaque année en fonction des centres d'intérêt définis à chaque renouvellement de l'enquête, mais un noyau dur de questions reste permanent à des fins comparatives.

Références / Publications

[Les niveaux d'usage des drogues en France en 2014](#), Observatoire des drogues et des toxicomanies