

Objectif 3 : Santé et bien-être

Cible ONU : 3.5 - Renforcer la prévention et le traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d'alcool

Indicateur 3.i5 : Consommation d'alcool

Concepts et définitions

Définition de l'indicateur :

Proportion de personnes parmi la population de 18 à 75 ans répartie selon différents modes de consommation d'alcool

Concepts :

Champ :

France métropolitaine, population des 18-75 ans

Commentaires :

Cet indicateur permet de suivre la proportion de personnes visés par la cible concernant l'abus d'alcool et donc l'efficacité de sa mise en œuvre.

Cet indicateur est un indicateur complémentaire¹ aux indicateurs Onusiens et peut être rattaché à la cible ONU 3.5.

Méthodologie

Méthode de calcul :

Le calcul de l'indicateur repose sur les réponses obtenues aux questions suivantes, incluant les trois premières questions de l'*Alcohol Use Disorder Identification Test* (AUDIT).

- « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu du vin, de la bière, des alcools forts, d'autres alcools comme du cidre, champagne, porto... ? » Tous les jours / 4 à 6 fois par semaine / 2 ou 3 fois par semaine / 1 fois par semaine / 2 ou 3 fois par mois / 1 fois par mois ou moins souvent / Jamais.
- « Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans la journée, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ? »

1. Un indicateur complémentaire est un indicateur ne pouvant pas être rattaché à un indicateur onusien car trop dissimilaire ; mais pouvant être rattaché à une cible ONU la plupart du temps.

- « À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres de boissons alcoolisées ou plus en une même occasion ? Jamais / Moins d'une fois par mois / Une fois par mois / Une fois par semaine / Tous les jours ou presque.
- « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été ivre ? »

La classification des buveurs qui en résulte comporte cinq niveaux pour cet indicateur :

- les individus ayant consommé de l'alcool au moins une fois dans l'année ;
- les individus ayant consommé de l'alcool tous les jours ;
- les individus ayant au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) (épisode de consommation d'au moins six verres en une occasion) au cours des 12 derniers mois ;
- les individus ayant au moins une ivresse au cours des 12 derniers mois ;
- les individus ayant au moins dix ivresses au cours des 12 derniers mois.

Désagrégations retenues :

Aucune

Désagrégations territoriales :

Il est possible de calculer des données régionales.

Source des données

Description :

Les données sont issues du Baromètre Santé volet Alcool : <https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france/barometre-sante-2017>

Champ de l'opération :

Champ géographique : France métropolitaine

Population statistique : population générale âgée de 15 à 85 ans en 2010, de 15 à 75 ans depuis 2014 et de 18 à 75 ans en 2017. Les séries sont refaites sur les mêmes tranches d'âge *a posteriori*.

Périodicité :

Variable

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l'espace) :

Le questionnaire est partiellement modifié chaque année en fonction des centres d'intérêt définis à chaque renouvellement de l'enquête, mais un noyau dur de questions reste permanent à des fins comparatives.

Références / Publications

[Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021](#), BEH, janvier 2023, Santé Publique France

[Consommation d'alcool, comportements et conséquences pour la santé](#), BEH, février 2019, Santé publique France